

## PROTOCOLE DE SANTÉ : MALADIES TRANSMISSIBLES À ÉVICTION DES ÉTABLISSEMENTS D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

### DÉFINITION

Le(la) Directeur(trice) applique les évictions prévues dans le « *guide des conduites à tenir en cas de maladies transmissibles dans une collectivité d'enfants* » du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

### CONDUITE À TENIR

- Renforcer les mesures d'hygiène
- Informer les familles, le personnel

### LISTE DES MALADIES À ÉVICTION OBLIGATOIRE ET DURÉE THÉORIQUE

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Coqueluche :</b> 5 jours après le début des antibiotiques</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rougeole :</b> 5 jours après le début de l'éruption</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gale :</b> commune 3 jours après la fin du traitement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Scarlatine :</b> 2 jours après le début des antibiotiques</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gastro-entérite (E. Coli-shigelle) :</b> Négativation de 2 coprocultures 24 heures d'intervalle après la fin du traitement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Streptocoque (angine, scarlatine) :</b> 2 jours après le début de l'antibiothérapie</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hépatite A :</b> 10 à 30 jours après le début de l'ictère</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Teigne :</b> Jusqu'à présentation d'un certificat de spécialistes confirmant le début d'un traitement adapté</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Impétigo :</b> 72 heures après le début des antibiotiques : si les lésions sont trop étendues et/ou ne peuvent pas être protégées</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tuberculose :</b> Certificat de non-contagion</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Infections invasives à méningocoque :</b> Hospitalisation. Suivre les instructions de l'ARS. Déclaration obligatoire.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Typhoïde :</b> 2 coprocultures négatives 48 heures après l'arrêt du traitement</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oreillons :</b> 9 jours après le début de la parotidite</li> </ul>	

Pour le confort de l'enfant et si les symptômes sont sévères, la fréquentation de la collectivité, durant la phase aiguë de la maladie, n'est pas conseillée.

La directrice de la structure ou de la Référente Santé et Accueil Inclusif apprécieront l'état de santé de l'enfant et prendront la décision de l'accueillir ou non.

- Angine virale	- Bronchiolite	- Bronchite	- Conjonctivite
- Gastro-entérite à germe non identifié	- Grippe	- Herpès (de type1)	- Otite
- Roséole	- Rhinopharyngite	- Varicelle	- Pieds-mains-bouche
- Gingivostomatite herpétique			